

子宮頸細胞(柏氏)抹片檢查 Cervical Screening

超薄柏氏抹片檢查 Thinprep (由女註冊護士進行 Sampling By Female Registered Nurse)	\$450
人類乳頭瘤病毒基因測試 (33種)* HPV DNA (33 Diseases)* 超薄柏氏抹片檢查 Thinprep (由女註冊護士進行 Sampling By Female Registered Nurse)	\$1,000
婦科檢查 Gynaecological Check-up 小便檢查 Urine Analysis 乳房及盤腔觸診 Breasts & Pelvis Palpation 超薄柏氏抹片檢查 Thinprep (檢查由女醫生進行 By Female Doctor)	\$780

只適合曾有性行為之女性 * 只適合30歲或以上之女性

身體檢查小貼士

1. 經期後一至兩星期進行超薄柏氏抹片檢查，能提供較準備之檢查結果。
2. 進行檢查前一天，避免進行任何陰道灌洗及性行為。
3. 如懷疑懷孕或於懷孕期間，不可進行超薄柏氏抹片檢查。



所有檢查項目 / 樣本必須於檢查日起一個月內完成 / 提供，逾期作廢及不獲退款。

毅力綜合醫護體檢中心 (辦公時間內回覆，只接受文字訊息Text Only)

<p>【佐敦 Jordan】 九龍佐敦彌敦道363號 恆成大廈14樓1409-12室 Room 1409-1412, 14/F, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Jordan, Kowloon WhatsApp: 9555 3733 Tel: 3426 9771</p>	<p>【銅鑼灣 Causeway Bay】 香港銅鑼灣軒尼詩道555號 東角中心(舊翼)17樓1709室 Room 1709, 17/F, East Point Center (Old Wing), 555 Hennessy Road, Causeway Bay, H.K. WhatsApp: 9555 9132 Tel: 3520 3292</p>	<p>【荃灣 Tsuen Wan】 新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號 南豐中心19樓1912室 Room 1912, 19/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, N.T. WhatsApp: 6129 9126 Tel: 3101 4866</p>	<p>【沙田 Sha Tin】 新界沙田沙田車站圍1號 連城廣場7樓708室 Shop 708, 7/F, Citylink Plaza, 1 Shatin Station Circuit, Shatin, N.T. WhatsApp: 9889 1599 Tel: 3704 7168</p>
---	--	---	---

服務時間 Service Hours: ● 星期一至五 Mon-Fri: 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 Sat: 09:00 - 14:00
● 星期日及公眾假期 Sun & Public Holiday: 休息 Closed

客戶服務 Customer Service: WhatsApp 9336 8186 (只接受文字訊息) / cs@kinetics.hk 網址 Website: www.kinetics.hk
一般查詢 General Enquiry: 2310 2997 / enquiry@kinetics.hk 網上商店 E-SHOP: www.kinetics-eshop.hk



條款及細則: 1. 有效期至2024年12月31日。2. 如有任何更改，恕不另行通知，以最新版本為準。3. 網上或WhatsApp預約只接受一星期以後之預約，所有預約必須待本中心職員回覆作實方為有效。未經確定的預約將不獲受理，不便之處，敬請原諒。4. 如有任何爭議，毅力醫護健康集團保留解釋和終止服務之最終決定權。版權所有，不得轉載。

kinetics.medical kineticsmedical

Copyright 2024 Jan

子宮頸癌 檢查及預防疫苗

Cervical Cancer Screening & Vaccination



預防子宮頸癌
注射HPV疫苗 + 柏氏抹片檢查
雙重保護 守護一生




認真 專注 關懷
Precise, Focus and Care

www.kinetics.hk
www.kinetics-eshop.hk

「子宮頸癌」是甚麼？


子宮頸癌是香港婦女常見的癌症之一，是一種影響子宮頸的惡性腫瘤。大部分子宮頸癌是由於持續感染其中一種致癌（或高風險類型）的人類乳頭瘤病毒（HPV）所致。

HPV可引致子宮頸的癌前病變及癌症。定期接受子宮頸篩查，及早發現和治療早期的子宮頸細胞癌前病變，能預防子宮頸癌。




「高危型」HPV 病毒：可引致子宮頸細胞病變和子宮頸癌等

「低危型」HPV 病毒：可引致生殖器官濕疣



一般而言，受HPV感染後，子宮頸上皮鱗狀細胞會發生變化，分為子宮頸上皮內瘤一級(CIN1)，二級(CIN2)和三級(CIN3)，最後成為子宮頸癌。



「子宮頸細胞(柏氏)抹片檢驗」

接種HPV疫苗只能預防因9種HPV病毒，並不能預防其他HPV病毒引起的相關癌症和疾病。因此，曾有性行為之女士應定期接受抹片檢查，從而減低患上子宮頸癌的機會。

子宮頸篩查是一種快捷而簡單的測試，以檢測子宮頸早期的不正常病變。25至64歲或有性經驗的婦女，都應該定期接受子宮頸篩查。若連續兩年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每三年接受一次篩查。

年齡 / 組別

檢查次數

25至64歲曾有性經驗的女性

必須定期進行子宮頸細胞(柏氏)抹片檢驗

64歲或以上曾有性經驗的女性

應向醫生查詢是否需要進行有關檢驗

已停經、多年沒有性生活或做了結紮手術的女性

應向醫生查詢是否需要進行有關檢驗

免疫力系統弱之女性

必須每年進行子宮頸細胞(柏氏)抹片檢驗

包括：曾進行器官移植、化療、類固醇治療或自體免疫病(如系統性紅斑狼瘡)

從未有性行為或者已進行全子宮切除手術的女性

不需要



對抗HPV 男女都得

9歲或以上男女都可以接種
愈早接種，抗體愈高

如何避免感染 HPV 病毒？

- 1 接種子宮頸癌預防疫苗**
接種疫苗有效預防女性患上子宮頸癌前病變及子宮頸癌，9歲或以上女性已可接種，愈早接種，抗體愈高，於未有性接觸前接種疫苗最為理想。
- 2 定期接受柏氏抹片檢查**
曾有性生活之女性都需要定期進行柏氏抹片檢查，可及早發現子宮頸癌細胞病變，從而儘早得到合適的治療。

子宮頸癌及預防疫苗之常見問題

- 1. 少女需要接種子宮頸癌疫苗嗎？會影響發育和經期嗎？**
 - 愈早接種抗體水平愈高，最好於未有性行為前接種，最佳接種時間為10至14歲。
 - 疫苗不會影響發育及經期，亦已通過大規模臨床測試。
- 2. 未有交往對象，需要接種HPV疫苗嗎？**
及早接種疫苗可有助減低感染HPV機會。由於HPV病毒主要經性接觸傳染，在未有性接觸前接種疫苗能提供較全面保護。而9-14歲接種可產生的免疫反應更強，故更應該提前做好準備。
- 3. 有固定性伴侶、不濫交及每次性行為均用安全套，便不會感染HPV？**
即使只有一個性伴侶，仍有60%感染風險，而且使用安全套仍無法完全避免感染。若不幸感染HPV患病，更有機會影響將來生育甚至下一代。
- 4. 子宮頸癌疫苗對已過26歲及已開始性行為/已受感染之女性是否有效？** (註: 1,2)
 - 疫苗於本港的女性和男性的註冊年齡已增至9歲或以上。
 - 疫苗雖未能治療已感染的病毒，但可預防將來再受感染。
 - 已受HPV感染之女性接種疫苗仍可預防日後感染HPV病毒，減低因持續感染而演變成子宮頸癌的機會。
 - 男性注射疫苗可預防生殖器官濕疣。
- 5. 男性可以接種HPV疫苗嗎？**
可以。大部分男性感染HPV並無症狀，而現時沒有獲批的男性HPV檢測方法。接種HPV疫苗是幫助男性預防HPV相關癌症和疾病的有效措施。
- 6. 曾經罹患HPV相關疾病(如抹片結果異常/椰菜花等)，接種HPV疫苗仍有效嗎？**
感染HPV不一定代表已感染所有可預防的HPV型號，故接種疫苗仍可幫助預防一些未曾感染的HPV。
- 7. 子宮頸癌疫苗有副作用嗎？**
較常見副作用是注射位置脹痛、紅腫或發燒等，通常都是輕微和短暫的。
- 8. 定期接受柏氏抹片檢查，已可預防子宮頸癌？**
 - 柏氏抹片檢查只可來檢驗子宮頸是否已出現病變細胞，無法預防HPV感染，接種疫苗是有效預防HPV病毒感染的方法。
 - 已注射子宮頸癌疫苗之女性，亦需要定期進行柏氏抹片檢查以確保未有受HPV所感染。
- 9. 如柏氏抹片檢查結果有不正常情況，應怎樣處理？**
 - 如柏氏抹片檢查結果屬輕微不正常，需要在6個月後再進行一次抹片覆檢或HPV-DNA測試。
 - 若覆檢結果仍出現不正常細胞變化或診斷確定有關變化轉壞，您便需要進行進一步測試，如陰道鏡檢查、希勒氏試驗或活組織檢查等。